

COVID-19 bij dialysepatiënten geregistreerd in Renine

Status op 22 november 2022

Inhoudsopgave

1	Inleiding.....	2
2	COVID-19 bij dialysepatiënten	3
2.1	Incidentie COVID-19	3
2.2	Overlevingscurves.....	6
3	COVID-19-vaccinaties bij dialysepatiënten	9
3.1	Patiëntkarakteristieken.....	9
3.2	Effecten van vaccinatie	10

1 Inleiding

In de kwaliteitsregistratie Renine wordt COVID-19 bij dialysepatiënten geregistreerd. Het doel is de incidentie en de gevolgen voor de dialysepatiënten in kaart te brengen. Sinds maart 2021 worden ook vaccinatiegegevens in Renine geregistreerd. Maandelijks publiceert Nefrovisie een rapport met de bijgewerkte cijfers. Dit rapport bevat cijfers tot 22 november 2022. De gegevens tot en met 2021 zijn door de centra gecontroleerd. Recentere data zijn echter nog niet compleet en gecontroleerd. Deze data zijn dan ook onder voorbehoud.

In dit rapport tonen we achtereenvolgens gegevens over de incidentie en de uitkomsten van COVID-19 in de dialysepopulatie, de vaccinatiestatus en de effecten van vaccinatie op uitkomsten. Van 23% van de huidige dialysepopulatie is een COVID-19-infectie geregistreerd. Van alle geregistreerde dialysepatiënten met COVID-19 overleed 13% binnen 28 dagen na vaststelling van COVID-19. Gedurende de eerste golf lag dit op 32%. Mannen en oudere patiënten hebben een hoger risico om te overlijden na een COVID-19-diagnose. Dit beeld komt overeen met de bevindingen in de algemene populatie.

De vaccinatiegraad is hoog, naar schatting is 92% van de patiënten gevaccineerd. Uit de voorlopige analyses komt naar voren dat vaccinatie de dialysepopulatie beschermt tegen het krijgen van COVID-19. Daarnaast lijkt vaccinatie te beschermen tegen ziekenhuisopnames ten gevolge van COVID-19.

2 COVID-19 bij dialysepatiënten

2.1 Incidentie COVID-19

In tabel 1 staan de COVID-19 episodes vermeld die sinds de start van de registratie in Renine zijn geregistreerd per tijdsperiode. De data over 2022 zijn nog niet volledig. In tabel 2 en 3 staan karakteristieken van de dialysepatiënten met COVID-19. Ter vergelijking zijn hierbij ook de karakteristieken weergegeven van de algemene dialysepopulatie zoals geregistreerd op 31 december 2021.

Van de totale dialysepopulatie vanaf 1 maart 2020 (start corona-pandemie) hebben 2.357 patiënten de diagnose COVID-19 gehad. Dit is 22% van de totale populatie die vanaf dat moment gedialyseerd heeft. Van 110 patiënten is een tweede COVID-19 diagnose geregistreerd.

In totaal is 29% van de dialysepatiënten met COVID-19 in het ziekenhuis opgenomen en 13% overleed binnen 28 dagen na het vaststellen van COVID-19. Gedurende de eerste golf lag dit respectievelijk op 59% en 32%. Op het eerste gezicht lijkt er geen sterke verbetering in uitkomsten na een COVID-19-infectie te zijn na het beschikbaar komen van vaccinaties (mei-nov 2021). Echter, zowel bij de infecties als bij ziekenhuis opnames waren niet-gevaccineerde patiënten oververtegenwoordigd. Het effect van vaccinatie is verder beschreven in hoofdstuk 3.2. De omikronvariant lijkt ook in de dialysepopulatie milder te zijn. Vanaf december 2021 is het percentage in het ziekenhuis opgenomen en overleden patiënten beduidend lager dan tijdens eerdere perioden.

Tabel 1. COVID-19 bij dialysepatiënten

	Totaal		t/m juni 2020		juli 2020 t/m apr 2021		mei 2021 t/m nov 2021		dec 2021 tm jul 2022		vanaf aug 2022	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Aantal besmettingen[#]	2.357		171	7%	727	31%	216	9%	1022	43%	221	9%
COVID-19 gegevens												
Positieve test	2.339	99%	164	96%	723	99%	215	100%	1016	99%	221	100%
Opname ziekenhuis	686	29%	101	59%	322	44%	91	42%	143	14%	29	13%
Opname IC	59	3%	5	3%	33	5%	15	7%	5	0%	1	0%
Overlijden <28 dagen*	317	13%	55	32%	157	22%	43	20%	55	5%	7	3%

[#]110 patiënten zijn geregistreerd met een tweede COVID-19-episode. *Niet-overleden patiënten met een korte follow-up (<28 dagen) zijn niet meegenomen in de berekening (N=31).


Tabel 2. Verdeling van dialysepatiënten met COVID-19 over de provincies en verdeling in prevalentie dialysepopulatie (op 31-12-2021)

	COVID-19 totaal	t/m juni 2020	juli 2020 t/m apr 2021	mei 2021 t/m nov 2021	dec 2021 tm jul 2022	vanaf aug 2022	Prevalente populatie
Drenthe	2%	2%	2%	1%	3%	3%	3%
Flevoland	3%	1%	4%	3%	3%	0%	2%
Friesland	4%	2%	2%	5%	5%	7%	3%
Gelderland	13%	13%	10%	10%	16%	17%	11%
Groningen	3%	1%	3%	1%	4%	5%	4%
Limburg	5%	12%	5%	10%	3%	1%	8%
Noord-Brabant	15%	27%	15%	13%	13%	13%	15%
Noord-Holland	16%	14%	19%	21%	15%	11%	18%
Overijssel	6%	5%	5%	4%	8%	11%	6%
Utrecht	6%	8%	7%	5%	5%	5%	7%
Zeeland	1%	0%	1%	2%	2%	3%	2%
Zuid-Holland	25%	16%	29%	25%	24%	22%	21%


Tabel 3. Karakteristieken van dialysepatiënten met diagnose COVID-19 en de prevalentie dialysepopulatie (31-12-2021).

	COVID-19 Totaal	t/m juni 2020	juli 2020 t/m apr 2021	mei 2021 t/m nov 2021	dec 2021 t/m jul 2022	vanaf aug 2022	Prevalente populatie
Aantal patiënten	2.357	171	727	216	1022	221	6.248
Modaliteit							
Hemodialyse	93%	88%	90%	92%	95%	95%	84%
Peritoneale dialyse	7%	12%	10%	8%	5%	5%	16%
Dialyseduur							
< 2 jaar	45%	35%	45%	44%	48%	41%	46%
2-5 jaar	33%	40%	32%	31%	32%	40%	33%
> 5 jaar	22%	26%	22%	25%	21%	19%	22%
Geslacht							
Man	61%	57%	60%	59%	63%	61%	60%
Vrouw	39%	43%	40%	41%	37%	39%	40%
Leeftijd							
<=44 jaar	8%	4%	9%	9%	10%	6%	9%
45-64 jaar	27%	25%	27%	27%	29%	24%	28%
65-74 jaar	25%	26%	27%	21%	25%	27%	27%
>=75 jaar	39%	45%	38%	43%	37%	43%	36%
Primaire nierziekte							
Glomerulonephritis/sclerose	9%	9%	8%	9%	9%	9%	11%
Pyelonefritis	4%	2%	3%	4%	5%	5%	4%
Cystenieren	5%	5%	5%	4%	5%	5%	5%
Hypertensie	16%	19%	14%	16%	17%	17%	18%
Renaal vasculair	9%	10%	10%	10%	8%	7%	10%
Diabetes type 1	3%	2%	3%	3%	3%	3%	3%
Diabetes type 2	23%	25%	26%	26%	20%	21%	18%
Overig	20%	16%	19%	17%	21%	21%	19%
Onbekend	11%	12%	11%	10%	11%	13%	12%

In figuur 1 en 2 is de incidentie van de COVID-19 in de dialysepopulatie over de tijd weergegeven.




Figuur 1. Aantal dialysepatiënten met COVID-19 per dag




Figuur 2. Aantal dialysepatiënten met COVID-19 cumulatief

2.2 Overlevingscurves


In de figuren 3 t/m 7 zijn Kaplan-Meier overlevingscurves weergegeven voor verschillende categorieën patiënten. In deze curves is het aandeel patiënten in leven (y-as) uitgezet tegen de tijd sinds COVID-19-diagnose in dagen (x-as). Onder de curves staat per tijdstip (0, 7, 14 en 28 dagen sinds diagnose) het aantal patiënten die 'at risk' zijn. Dit zijn de patiënten die op dat moment in leven zijn en die een follow-up duur hebben van ten minste dat aantal dagen. Mannen en oudere patiënten hebben een hoger risico om te overlijden na COVID-19. Dit beeld komt overeen met de algemene bevolking. Sterfte is hoger in peritoneale dialyse dan in hemodialyse patiënten. Dit kan echter ook komen doordat er in de thuissituatie mogelijk minder getest is waardoor infecties met mild verloop niet zijn geregistreerd.




Figuur 3. Kaplan-Meier curves voor geslacht




Figuur 4. Kaplan-Meier curves voor leeftijdscategorieën



Figuur 5. Kaplan-Meier curves voor dialysemodaliteiten



Figuur 6. Kaplan-Meier curves voor categorieën dialyseduur



Figuur 7. Kaplan-Meier curves voor categorieën primaire nierziekten

3 COVID-19-vaccinaties bij dialysepatiënten

3.1 Patiëntkarakteristieken

In tabel 4a en 4b staan de patiëntkarakteristieken van de op dit moment geregistreerde dialysepatiënten uitgesplitst naar hun vaccinatiestatus. Van 38% van de populatie is de vaccinatiestatus (nog) niet bekend. In de groep met bekende vaccinatiestatus is een hoog percentage (92%) gevaccineerd. De leeftijd van de groep dialysepatiënten die niet gevaccineerd is, ligt iets lager dan in de groep die wel gevaccineerd is. Daarnaast is het percentage vrouwen bij de niet-gevaccineerde groep iets hoger dan in de gevaccineerde groep.

Tabel 4a. Karakteristieken van dialysepatiënten gesplitst naar vaccinatiestatus op 22-11-2022

	Gevaccineerd [#]		Niet gevaccineerd		Onbekend/niet geregistreerd ^{##}	
	N	%	N	%	N	%
Aantal dialysepatiënten op peildatum*	3.463	57%	281	5%	2.334	38%
Geregistreerde vaccinatiestatus**	3.463	92%	281	8%		
Type vaccinatie						
BioNTech-Pfizer	957	28%				
Moderna	2.134	62%				
AstraZeneca of Jansen	96	3%				
Onbekend of niet ingevuld	276	8%				
COVID-19						
Covid-19 diagnose totaal	1011	29%	112	40%	303	13%
Covid-19 diagnose na 1-5-2021	744	21%	80	28%	211	9%
- voor vaccinatie	1					
- na 1 ^e vaccinatie en voor 2 ^e vaccinatie	4					
- na 2 ^e vaccinatie	706					
- onbekend***	33					
Modaliteit						
Hemodialyse	3.026	87%	251	89%	1.868	80%
Peritoneale dialyse	437	13%	30	11%	466	20%
Dialyseduur						
< 2 jaar	1.043	30%	76	27%	1.526	65%
2-5 jaar	1.492	43%	116	41%	475	20%
> 5 jaar	928	27%	89	32%	333	14%

[#] Ten minste één vaccinatie.

^{##} Patiënten waarvan de vaccinatiegegevens (nog) niet zijn geregistreerd, zijn in deze categorie meegenomen. Op de peildatum betrof dit 1.416 patiënten met onbekende vaccinatiestatus en 918 patiënten waarbij het centrum (nog) geen gegevens heeft doorgegeven.

* De patiëntkarakteristieken zijn van de prevalentie volwassen dialysepopulatie (18+) op de aangegeven peildatum.

** Dit betreft de populatie patiënten van wie de vaccinatiestatus bekend is in Renine. Binnen deze groep is de verdeling gevaccineerd/niet-gevaccineerd 92%/ 8%.

*** Van deze patiënten zijn de datums van de vaccinaties onbekend.

Tabel 4b. Karakteristieken van dialysepatiënten gesplitst naar vaccinatiestatus op 22-11-2022

	Gevaccineerd [#]		Niet gevaccineerd		Onbekend/niet geregistreerd ^{##}	
	N	%	N	%	N	%
Geslacht						
Man	2.087	60%	149	53%	1.437	62%
Vrouw	1.376	40%	132	47%	897	38%
Leeftijd						
<=44 jaar	230	7%	59	21%	227	10%
45-64 jaar	987	29%	93	33%	679	29%
65-74 jaar	932	27%	60	21%	582	25%
>=75 jaar	1.314	38%	69	25%	846	36%

[#] Ten minste één vaccinatie.

^{##} Patiënten waarvan de vaccinatiegegevens (nog) niet zijn geregistreerd, zijn in deze categorie meegenomen. Op de peildatum betrof dit 1.416 patiënten met onbekende vaccinatiestatus en 918 patiënten waarbij het centrum (nog) geen gegevens heeft doorgegeven.

3.2 Effecten van vaccinatie

Om in te schatten wat het effect is van het vaccinatieprogramma op het risico op het krijgen van COVID-19 en op de uitkomsten na een infectie zijn verschillende analyses gedaan. Als eerste zijn de uitkomsten vergeleken tussen COVID-19-infecties in patiënten die ten tijde van de infectie al dan niet gevaccineerd waren. Hierbij is gevaccineerd gedefinieerd als de eerste vaccinatie ten minste 2 weken voor de datum van de COVID-19-infectie. Alleen COVID-19-diagnoses na 1 mei 2021 zijn vergeleken, omdat het merendeel van de patiënten voor deze datum de eerste vaccinatie heeft (kunnen) ontvangen. Om na te gaan of de omikronvariant van invloed is op de bescherming door vaccinatie, zijn de resultaten apart weergegeven voor COVID-19-diagnoses in de periode mei 2021-november 2021 (tabel 5a) en COVID-19-diagnoses vanaf december 2021 (tabel 5b, omikronvariant werd dominant). Tijdens de eerste periode werd 56% van de niet-gevaccineerde groep opgenomen in het ziekenhuis tegen 33% in de gevaccineerde populatie. Tijdens de omikron-periode was dit respectievelijk 41% en 11%.

Tabel 5a. Uitkomsten na COVID-19-diagnoses periode mei 2021 – november 2021, afzonderlijk voor vaccinatiestatus op de datum van de COVID-19 diagnose

	Gevaccineerd [*] N=125 (58%)	Niet gevaccineerd N=32 (15%)	Vaccinatiestatus onbekend N=58 (27%)	P verschil tussen groepen ^{**}
Opname ziekenhuis	41 (33%)	18 (56%)	32 (55%)	0.004
Opname IC	9 (7%)	3 (9%)	3 (5%)	-
Overlijden door COVID-19	13 (10%)	7 (22%)	16 (28%)	0.01
Overlijden <28 dagen na COVID-19-diagnose ^{***}	16 (13%)	8 (25%)	19 (33%)	0.005

^{*} Datum eerste vaccinatie ten minste 14 dagen voorafgaand aan de COVID-19 diagnose.

^{**} Verschillen tussen de groepen zijn getoetst met Chi-square. Voor IC-opnames is niet getoetst in verband met te lage aantallen.

^{***} Niet-overleden patiënten met een korte follow-up (<28 dagen) zijn niet meegenomen in de berekening.

Tabel 5b. Uitkomsten na COVID-19-diagnoses periode vanaf december 2021, afzonderlijk voor vaccinatiestatus op de datum van de COVID-19 diagnose

	Gevaccineerd*	Niet gevaccineerd	Vaccinatiestatus onbekend	P verschil tussen groepen**
	N=804 (71%)	N=83 (7%)	N=243 (22%)	
Opname ziekenhuis	92 (11%)	34 (41%)	38 (16%)	<0.001
Opname IC	2 (0,3%)	2 (2%)	2 (1%)	-
Overlijden door COVID-19	12 (1%)	6 (7%)	6 (2%)	-
Overlijden <28 dagen na COVID-19-diagnose***	34 (4%)	10 (12%)	13 (6%)	0.01

* Datum eerste vaccinatie ten minste 14 dagen voorafgaand aan de COVID-19 diagnose.

** Verschillen tussen de groepen zijn getoetst met Chi-square. Voor IC-opnames en overlijden door COVID-19 zijn niet getoetst in verband met te lage aantallen.

*** Niet-overleden patiënten met een korte follow-up (<28 dagen) zijn niet meegenomen in de berekening.

In tabel 6 staan de karakteristieken van de patiënten in de periode vanaf 1 mei 2021. Van de patiënten met COVID-19 in deze periode was 9% geregistreerd als niet gevaccineerd. Binnen de groep met bekende vaccinatiestatus (N=1044) was het percentage niet-gevaccineerd 11% (115/1044).

Tabel 6. Karakteristieken dialysepatiënten met COVID-19-diagnose vanaf 1 mei 2021.

	Gevaccineerd*	Niet gevaccineerd	Vaccinatiestatus onbekend	P verschil tussen groepen*
	N=929 (69%)	N=115 (9%)	N=301 (22%)	
Leeftijd gemiddeld	68	65	67	0,585
Categorieën leeftijd				0,103
<=44 jaar	8%	17%	9%	
45-64 jaar	27%	27%	27%	
65-74 jaar	25%	21%	25%	
>=75 jaar	40%	36%	39%	
Geslacht, man	63%	57%	61%	0,318

* Verschillen tussen de groepen zijn getoetst met Chi-square en ANOVA.

Vervolgens is gekeken of het risico op het krijgen van COVID-19 en COVID-19 gerelateerde uitkomsten (ziekenhuis- en IC-opnames, sterfte t.g.v. COVID-19) verschilt voor de gevaccineerde en ongevaccineerde dialysepatiënten. Dit is onderzocht in de populatie die op 1 mei 2021 chronische dialysebehandeling ontving en van wie de vaccinatiestatus bekend is. Het gaat hierbij om 4.644 patiënten waarvan 88% gevaccineerd is en 12% niet. Alle patiënten die ten minste 1 vaccinatie hebben gehad, zijn ingedeeld in de gevaccineerde groep. Vervolgens is deze analyse herhaald met 1 december 2021 als referentiedatum (omikronperiode).

De resultaten zijn gepresenteerd in tabel 7a en 7b als hazard ratio's (HR) met een 95%-betrouwbaarheidsinterval. Een hazard ratio lager dan 1 betekent een lager risico voor de betreffende uitkomst in de gevaccineerde populatie ten opzichte van de niet-gevaccineerde populatie. In de laatste kolom staan de hazard ratio's na correctie voor leeftijd, geslacht en sociaaleconomische status (3 categorieën). Vaccinatie blijkt het risico op het oplopen van COVID-19 te verlagen in beide perioden. De bescherming lijkt iets af te nemen tijdens de omikron-periode (HR=0.68 versus HR=0.35). Daarnaast zien

we in beide perioden gunstige effecten op het risico op ziekenhuisopnames, sterfte t.g.v. COVID-19 en totale sterfte.

Tabel 7a. Hazard ratio's (HR) met een 95%- betrouwbaarheidsinterval (referentiedatum 1 mei 2021)

	Aantal uitkomsten	HR ongecorrigeerd	HR gecorrigeerd
COVID-19-diagnose	147	0.36 (0.24-0.54)	0.35 (0.23-0.54)
Opname ziekenhuis	57	0.25 (0.14-0.46)	0.25 (0.13-0.46)
Opname IC	12	0.24 (0.07-0.90)	0.26 (0.07-0.98)
Sterfte t.g.v. COVID-19	18	0.13 (0.05-0.33)	0.12 (0.05-0.32)
Sterfte – algemeen*	366	0.78 (0.55-1.10)	0.68 (0.48-0.97)

*Overlijdens tot december 2021

Tabel 7b. Hazard ratio's (HR) met een 95%- betrouwbaarheidsinterval (referentiedatum 1 december 2021)

	Aantal uitkomsten	HR ongecorrigeerd	HR gecorrigeerd
COVID-19-diagnose	840	0.71 (0.57-0.90)	0.68 (0.54-0.86)
Opname ziekenhuis	122	0.19 (0.13-0.29)	0.17 (0.11-0.26)
Opname IC	4	-	-
Sterfte t.g.v. COVID-19	18	0.15 (0.07-0.40)	0.12 (0.04-0.31)
Sterfte - algemeen	720	0.87 (0.67-1.13)	0.72 (0.55-0.94)